



INFORMACJA DLA PACJENTÓW OPEROWANYCH Z POWODU PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ

Planowany zabieg:
operacja przepukliny pachwinowej metodą Lichtenstein'a

INFORMACJA O CHARAKTERZE I CELU PLANOWANEGO ZABIEGU

Leczenie operacyjne przepukliny jest jedyną skuteczną metodą zapobiegania powikłaniom i dolegliwościom związanym z przepukliną.

Operacja przepukliny pachwinowej metodą Lichtenstein'a polega na nacięciu skóry w okolicy pachwiny i wzmocnieniu struktur kanału pachwinowego specjalnym materiałem syntetycznym – tzw. siatką. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i sedacji anestetycznej. Po zabiegu konieczna jest codzienna zmiana opatrunków do czasu wizyty kontrolnej oraz unikanie dźwigania ciężarów przez około 3 miesiące. Powrót do domu w towarzystwie osoby dorosłej możliwy jest kilkanaście godzin po zabiegu.

Leczenie operacyjne przepukliny pachwinowej ma na celu:

- Zmniejszenie ryzyka uwięźnięcia przepukliny i spowodowanej tym niedrożności lub martwicy jelit
- Zmniejszenie dolegliwości bólowych

POTENCJALNE POWIKŁANIA W TRAKCIE I PO ZABIEGU

Powikłania i następstwa zabiegu niezbyt częste (ok. 1%) stosunkowo niegroźne i ustępujące

- ból pooperacyjny
- ból przewlekły
- krwiaki
- przerośnięta blizna lub bliznowiec
- parestezje (zaburzenia czucia) w okolicach rany operacyjnej
- wyciek chłonki z rany operacyjnej
- obrzęk jądra
- zakażenie rany pooperacyjnej i wszczepionego materiału syntetycznego
- martwica skóry
- zaburzenia rytmu serca
- niepożądane działania leków – wysypka, uczulenia,

Powikłania bardzo rzadkie (<0,5%) ale ciężkie i powodujące zagrożenie życia

- zakrzepica żył głębokich
- zator tętnicy płucnej
- uraz narządów jamy brzusznej (pęcherz moczowy, jelito)
- zanik jądra
- niepożądane działania leków – reakcja anafilaktyczna, wstrząs
- niewydolność krążeniowo-oddechowa, zawał mięśnia sercowego
- objawy ze strony centralnego układu nerwowego
- inne, rzadkie i trudne do przewidzenia powikłane kalectwem i zgonem włącznie)

ALTERNATYWNE METODY LECZENIA

- operacja metodą napięciową – bez siatki
- operacja przepukliny metoda laparoskopową
- pas przepuklinowy



SZPITAL ESKULAP

CENTRUM LECZENIA CHOROÓB SERCA I NACZYŃ

INFORMACJA DLA PACJENTÓW OPEROWANYCH Z POWODU PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ

Planowany zabieg: operacja przepukliny pachwinowej metodą Lichtenstein'a

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA SIĘ DO OPERACJI

- W dniu zabiegu należy zgłosić się o wyznaczonej godzinie do Szpitala ESKULAP ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko k. Bydgoszczy
- Do Szpitala należy zabrać ze sobą:
 - dokument potwierdzający ubezpieczenie (w przypadku świadczeń w ramach NFZ) lub dowód wpłaty w przypadku zabiegu odpłatnego
 - dowód osobisty,
 - zaświadczenie o szczepieniu przeciw żółtacze,
 - wypisy z wcześniejszych pobytów w szpitalu,
 - spis zażywanych leków – prosimy wypełnić załączony formularz,
 - w przypadku chorób przewlekłych - opinia lekarza o braku przeciwwskazań do operacji,
 - rzeczy osobiste (piżama, przybory toaletowe, mały ręcznik, laczki, zapasową bieliznę)
 - leki zażywane stale (przeciw nadciśnieniu tętniczemu, insuliny, przeciwastmatyczne itp)
 - wyniki następujących badań:
 - morfologia krwi z płytkami
 - antygen Hbs, anty-HCV
 - APTT, INR
 - ekg (pacjenci powyżej 40 r.ż. lub leczący się z powodu chorób serca)
 - innych badań (jeśli zostały zlecone przez chirurga)
- W przypadku zażywania leku zmieniającego krzepliwość krwi: jak, *Warfin, Sintrom, Acenocumarol, Arixtra, Xarelto, Areplex, Plavix, Zylt, Clopidogrel Polocard, Acard* lub preparaty kwasu acetylosalicylowego, po konsultacji ze swoim chirurgiem lub lekarzem pierwszego kontaktu odstawić na 7 dni przed operacją.
- W dniu poprzedzającym zabieg należy zjeść lekki posiłek w godzinach wieczornych.
- W dniu zabiegu należy nie jeść ani nie rzuć gumy przez 6 godzin przed przyjęciem do Szpitala. Można pić wodę niegazowaną do 4 godzin przed przyjęciem do Szpitala.
- Pacjent opuszcza szpital w towarzystwie opiekuna w dniu następnym rano ok. godz. 7.30
- Przez 24 godz. po zabiegu nie wolno spożywać alkoholu, prowadzić pojazdów mechanicznych, ani podejmować ważnych życiowo decyzji
- Przez 3 miesiące należy unikać dźwigania ciężarów
- Wizyta kontrolna odbywa się w terminie 5-10 dni po zabiegu – prosimy sprawdzić miejsce, datę i godzinę wizyty kontrolnej na otrzymanej po zabiegu Karcie Informacyjnej
- Wizyty kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu są bezpłatne
- Umówioną kwotę opłaty za zabieg należy przelać, 3 dni przed zabiegiem na konto:

BNP Paribas 62 1600 1185 0004 0807 8955 6001

ESKULAP BIS S.C. Ewa Molska Stanisław Molski
ul Koperkowa 2 86-031 Osielsko