



## **INFORMACJA O OPERACJI PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ I BRZUSZNEJ**

Leczenie operacyjne przepukliny pachwinowej lub brzusznej jest jedyną skuteczną metodą zapobiegania powikłaniom i dolegliwościom związanym z przepukliną.

Operacja przepukliny polega na nacięciu skóry wzmocnieniu struktur powięziowych szwami chirurgicznymi lub specjalnym materiałem syntetycznym – tzw. siatką. Zabieg najczęściej wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i sedacji anestetycznej. Po zabiegu konieczna jest codzienna zmiana opatrunków do czasu wizyty kontrolnej oraz unikanie dźwigania ciężarów przez około 3 miesiące. Powrót do domu w towarzystwie osoby dorosłej możliwy jest kilkanaście godzin po zabiegu.

Leczenie operacyjne przepuklin pachwinowych i brzusznych ma na celu:

- Zmniejszenie ryzyka uwięźnięcia przepukliny i spowodowanej tym niedrożności lub martwicy jelit
- Zmniejszenie dolegliwości bólowych

### **POTENCJALNE POWIKŁANIA W TRAKCIE I PO ZABIEGU**

**Najczęstsze powikłania i następstwa zabiegu (<10%) stosunkowo niegroźne i ustępujące**

- ból pooperacyjny
- krwiaki
- przerośnięta blizna lub bliznowiec
- parestezje ( zaburzenia czucia skórne ) w okolicach rany operacyjnej
- obrzęk jądra ( w przypadku przepukliny pachwinowej u mężczyzn )

**Powikłania i następstwa zabiegu niezbyt częste ( ok.1% ) stosunkowo niegroźne i ustępujące**

- nawrót przepukliny
- ból przewlekły
- wyciek chłonnki z rany operacyjnej
- zanik jądra ( w przypadku przepukliny pachwinowej u mężczyzn )
- zakażenie rany pooperacyjnej i wszczepionego materiału syntetycznego, bakteriemia, sepsa
- martwica skóry
- zaburzenia rytmu serca

**Powikłania bardzo rzadkie (<0,5%) ale ciężkie i powodujące zagrożenie życia**

- zakrzepica żył głębokich
- zator tętnicy płucnej
- uraz narządów jamy brzusznej ( pęcherz moczowy, jelito )
- zapalenie otrzewnej i sepsa
- niepożądane działania leków – reakcja anafilaktyczna, wstrząs
- niewydolność krążeniowo-oddechowa, zawał mięśnia sercowego, zgon
- objawy ze strony centralnego układu nerwowego
- inne, rzadkie i trudne do przewidzenia powikłane kalectwem i zgonem włącznie)

### **ALTERNATYWNE METODY LECZENIA**

- operacja przepukliny metoda laparoskopową
- pas przepuklinowy



## INFORMACJA O OPERACJI PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ I BRZUSZNEJ PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

- Wyniki badań na 14 dni przed zabiegiem należy przestać emailem
  - morfologia krwi z płytkami, APTT, INR, sód, potas, glukoza, kreatynina, TSH, antygen Hbs, przeciwciała anty-HCV
  - grupa krwi lub krewkarta,
  - EKG z opisem - pacjenci powyżej 40 r.ż. lub leczący się z powodu chorób serca
  - W przypadku operacji przepukliny brzusznej RTG klatki piersiowej ( ważne 2 lata )
- W przypadku stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych w porozumieniu z lekarzem POZ i anesteziologiem, przed zabiegiem zamienić na heparyny drobnocząsteczkowe lub wstrzymać na 1-2 dni. Leki przeciwplatekcyjne należy odstawić na 7 dni przed operacją.
- W dniu operacji przed przyjazdem do szpitala należy przyjąć stale stosowane leki i dokładnie umyć całe ciało.
- Nie należy jeść przez 5 godz przed przyjęciem do szpitala. Picie wody niegazowanej i żucie gumy jest dozwolone do 4 godz. przed przyjęciem.
- Do Szpitala należy zabrać ze sobą:
  - dowód tożsamości,
  - leki zażywane na stałe, spis stosowanych leków
  - wyniki zleconych badań, karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu,
  - zaświadczenie o szczepieniu przeciwko żółtacze WZW B i SARS-CoV2 ( jeśli się odbyło ),
  - dobrą książkę, gazetę lub sprzęt do słuchania muzyki,
  - piżamę, bieliznę na zmianę, ręcznik, przybory toaletowe, obuwie antypoślizgowe
- Operacja wykonywana jest w dniu po przyjęcia do Szpitala
- Pacjent opuszcza szpital w towarzystwie opiekuna następnego dnia po operacji
- Przez 24 godziny po zabiegu nie wolno spożywać alkoholu, prowadzić pojazdów mechanicznych, ani podejmować ważnych życiowo decyzji
- Pierwsza wizyta kontrolna odbywa się około 10 dni po zabiegu.

### Przygotowanie w dniu poprzedzającym operację:

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia rany operacyjnej, przed zabiegiem **konieczne jest dokładne umycie całego ciała**. Jeżeli nie możesz sobie poradzić sam poproś o pomoc. Zalecany sposób mycia:

- Zmocz całe ciało i włosy. Nałóż szampon na włosy, umyj je.
- Nabierz mydło na ręce i starannie umyj całe ciało. Zaczynj od góry i przesuwaj się w dół, szczególnie starannie umyj: twarz, dłonie, doły pachowe, brzuch i bardzo dokładnie pępek, pachwiny, narządy płciowe i okolice odbytu, stopy
- Zmyj środek myjący. Powtórz wszystkie czynności jeszcze raz.
- Osusz ciało czystym ręcznikiem - zaczynj od góry i przesuwaj się w dół.
- Załóż czystą bieliznę i ubranie.

### OPŁATY

W przypadku zabiegów odpłatnych opłatę należy przelać, 30 dni przed zabiegiem na konto:  
PKO BP 42 1020 1068 0000 1002 0378 7652 SWIFT: BPKOPLPW  
Eskulap bis s.c. Ewa Molska Stanisław Molski, ul Koperkowa 2, 86-031 Osielsko

**Umawianie terminu zabiegów: tel. 52 32 65 896 w godz. 9 - 21  
lub email: [hospitalizacja@szpitaleskulap.pl](mailto:hospitalizacja@szpitaleskulap.pl)**